

Linitis plastica

Linitis plastica je morfologický podtyp difúzního adenokarcinomu žaludku. Je charakterizovaný ztlušťováním žaludeční stěny a její rigiditou (vyšší tuhostí), která je podmíněna **fibrózou**. Symptomy u tohoto typu adenokarcinomu přicházejí později v porovnání s jinými morfologickými typy, a tak pokud se objeví, nádor už bývá v pokročilém stadiu.

Morfologie

- **Makroskopicky:** bývá postihnuta převážná část žaludku nebo kompletně celá jeho stěna. Sliznice nebývá postihnuta ulcerací či jinými defekty. Žaludek nabývá vzhledu staré kožené láhve.
- **Mikroskopicky:** obsahuje anaplastické buňky (nízce diferencované) s mucinovými vakuolami, které vytlačují jádro k periférii. Vzhledově tak připomínají prstence. Proto se nazývají prstenčité.

Léčba a prognóza

Jelikož bývá objeven až v pokročilém stavu, chirurgická řešení nebývají příliš úspěšná. Nádor již často metastazoval (viz adenokarcinom žaludku) a přistupuje se k chemoterapii.

Odkazy

Související články

- Patologie adenokarcinomu žaludku
- Nádory žaludku
- Karcinom žaludku
- Žaludek

Zdroj

- KUMAR, [edited by] Vinay, Vinay KUMAR a Jon C. Aster ; with illustrations by James A PERKINS. *Robbins and Cotran pathologic basis of disease : [Object Object]*. 9. vydání. Philadelphia : Elsevier Saunders, c2015. ISBN 9781455726134.
- Jafferbhoy S, Shiwani H, Rustum Q. Managing Gastric Linitis Plastica: Keep the scalpel sheathed. Sultan Qaboos University Medical Journal. 2013;13(3):451-453.