

Mycosis fungoides

Mycosis fungoides je epidermoidní kožní T-lymfom charakterizovaný proliferací malých nebo středně velkých lymfocytů. Postihuje primárně kůži, může však postupným vývojem tvořit squamozní ložiska s postupnou tvorbou nádorů, postižením lymfatických uzlin a vnitřních orgánů.

Klinický obraz

Vývoj trvá roky (bez léčby 10–15 let). Postupný vývoj ve stádiích.

1. **Premykotické stádium:** formou tzv. *parapsoriasis en plaques* (na trupu tvorba olupujících se ploch) nebo formou *poikilodermickou* (teleangiektázie a depigmentace).
2. **Infiltrační stádium:** tvoří se nádory s rozpadajícími se vředy.
3. **Tumorózní stádium:** vytvořeny nádory, některé s vkleslým povrchem tvaru klobouku hub (odtud název). V tomto stadiu jsou již také postiženy vnitřní orgány.

Projevy bývají asymptomatické, ale při postižení kožních nervů se objevuje **svědění nereagující na antihistaminika**.

Klinické varianty

- Folikulotropní MF
- Pagetoidní retikulóza
- Granulomatózní ochablá kůže
- Sézaryho syndrom

Sézaryho syndrom je leukemická forma Mycosis fungoides současně s výskytem erytrodermie, generalizovanou lymfadenopatií a hepatosplenomegalií. Klinicky se vyskytuje červenofialové zbarvení kůže, šupení celé kůže až ztráta nehtů a alopecie a úporné svědění.

Histopatologický obraz

Epidermotropismus a Pautrerovy mikroabscesy v epidermis.

Terapie

Fotochemoterapie (PUVA) pro postižení pouze kůže. Dále aplikace karmustinu, kortikoidů a retinoidů. Při větším zasažení se užívá interferon α .

Průběh a prognóza

Chronický průběh i desítky let. Prognóza dle šíře postižení.

Odkazy

Související články

- Lymfom
- Kožní lymfom
- Lymfomy CNS
- Lymfom Hodgkinův

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.



Mycosis fungoides kolene



Mycosis fungoides



Mycosis fungoides – červen 1902



Mycosis fungoides – říjen 1902



Sézaryho syndrom