

# Mykoplazmatové infekce genitálu

**Mykoplazmatové infekce genitálu** jsou velmi často přítomny u sexuálně žijící populace. Promořenost obyvatelstvem je až 75%. Mykoplazmatové infekce často doprovázejí jiné původce infekcí urogenitálního traktu, např. chlamydie a neisserie.

## Klinický obraz

Projeví se za určitých podmínek.

- *Ureaplasma urealyticum* způsobuje 25 % všech uretritid. Projevuje se svěděním, pálením a bělavým výtokem.
- *Mycoplasma hominis* a *Mycoplasma genitalium* bývá při zánětlivém onemocnění pánve.

## Diagnóza

Diagnóza se provádí kultivací a důležité je vyloučení jiných příčin onemocnění.

## Terapie

Lékem první volby je doxycyklin, azithromycin. Popřípadě se užívá erythromycin, klindamycin.

## Odkazy

### Externí odkazy


- Výukový portál LFP — Nejčastější kožní onemocnění na genitálu (<http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=193>)

### Související články

- Uretritidy:
  - Kapavka
  - Chlamydiové infekce genitálu
- Vulvovaginitidy
- Balanitis
- Phimosis
- Paraphimosis
- M. Peyronie
- Význam chlamydií a mycoplasmat v perinatologii

### Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.



Genová mapa bakterie *Mycoplasma genitalium*