

# Obrna



**Obrna** vzniká v důsledku poruchy inervace dané svalové skupiny. Dochází k částečné ztrátě hybnosti končetiny. Obrna může mít infekční i neinfekční původ.

## Odkazy

### Související články

- Dětská přenosná obrna
- Dětská mozková obrna
- Plegie

### Hlavové nervy

- parézy N. VII: Obrna lícního nervu • Paréza nervus facialis/PGS • Paréza nervus facialis/PGS (VPL)
- parézy N. X: Paréza nervus laryngeus recurrens • Paréza nervus laryngeus superior

### Horní končetina

- Obrna nervus axillaris
- Obrna nervus medianus
- Obrna nervus ulnaris
- Obrna nervus radialis

### Dolní končetina

- Obrna nervus femoralis
- Obrna nervus ischiadicus
- Obrna nervus tibialis
- Obrna nervus peroneus communis

## Externí odkazy

- Periferní paréza a její léčba - konzervativní, medikamentozní, rehabilitační ([http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/neurologie/periferni\\_pareza\\_a\\_jeji\\_lecba\\_konzervativni\\_medikamentozni\\_rehabilitacni.html](http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/neurologie/periferni_pareza_a_jeji_lecba_konzervativni_medikamentozni_rehabilitacni.html))
- Akutní paréza lícního nervu - srovnání klinických a laboratorních parametrů u pacientů s boreliovou a idiopatickou etiologií (<https://www.muni.cz/vyzkum/publikace/815433>)