

# Sací reflex



**Sací reflex** se vybavuje dotykem nebo přejetím špátlí, a to mentolabiálně nebo nasolabiálně nebo přímo po rtu, přičemž při pozitivitě příznaku dojde k jejich sešpulení.<sup>[1]</sup> Vzácně na podráždění pacient reaguje doslova "chňapnutím" rty, tzv. *bulldog* reflex.<sup>[2]</sup> Podobně jako labiální reflex je přítomen fyziologicky pouze u kojenců. Patologicky je projevem deliberace frontálních laloků.<sup>[1]</sup>

► Video - Vyšetření sacího reflexu, fyziologický nález (Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video11.html>)<sup>[1]</sup>

## Odkazy

### Související články

- Labiální reflex

### Externí odkazy

- Neurologické vyšetření - norma (<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>) (Centrum elektronického vzdělávání 1.lf UK)

## Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. *Klinická neurologie*. 2. vydání. Praha : Triton, 2008-. ISBN 9788073871574.