

# Syndrom temporálního laloku

Syndrom temporálního laloku je charakterizován těmito symptomy:

## Symptomy <sup>[1]</sup>

- **psychické poruchy** – organický psychosyndrom, který se může podobat až prefrontálnímu syndromu
- **poruchy chování** – někdy až psychotické rysy nebo agresivita, pocity jako ve snu, depersonalizace
- **poruchy vnímání** (rozdíl od prefrontálního syndromu) – pseudohalucinace, iluze, že nemocný již danou věc viděl, slyšel nebo prožil, nebo naopak nepoznává známé osoby či věci
- **Wernickeova nebo amnestická afázie** při lézi dominantní hemisféry
- **porucha prostorové orientace** při lézi nedominantní hemisféry, neglect syndrom
- **korová hluchota** při oboustranné lézi
- dále mohou být:
  - **závratě**
  - **kontralaterální homonymní hemianopsie** při lézi bílé hmoty s porušením radiatio optica <sup>[2]</sup>
  - **parciální komplexní epileptický záchvat**
  - **unciformní krize** – záchvaty čichových parosmií, většinou nepříjemných čichových vjemů (kakosmií). Jedná se o pseudohalucinace (nemocný si patologii vjemu uvědomuje, má náhled).<sup>[2]</sup>
  - **mráкотné stavy (dreamy states)**<sup>[2]</sup>

## Odkazy

### Související články

- Prefrontální syndrom
- Syndrom frontálního laloku
- Rolandický syndrom
- Syndrom okcipitálního laloku
- Syndrom parietálního laloku
- Funkční korové oblasti

### Reference

1. AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. 6. vydání. Praha : Galén, 2006. 351 s. ISBN 80-7262-433-4.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.