

Atypické rozštěpy obličeje

Atypické rozštěpy obličeje dělíme na:

Příčné rozštěpy

Vznikají poruchou vývoje v oblasti 1. + 2. žaberního oblouku.

- rozštěp ústního koutku, hypoplazie mandibuly, deformace až aplázie boltce, atrézie zvukovodu

Horní střední rozštěpy

Projevují se různým stupněm rozštěpu nosu, rtu, čelisti a patra.

Dolní střední rozštěpy

Dolní střední rozštěpy jsou velmi vzácné. Do této kategorie spadá rozštěp dolního rtu, případně čelisti a jazyka mohou být doprovázeny rozštěpem krku, sterna, diastázou mm. recti abdominis až k pupku.

Šikmé rozštěpy

Postihují horní ret zevně od filtra, často i nosní křídlo + dolní víčko, vzácně oční štěrbinu.

- **paraaxiální:** z horního rtu přes nos do orbity
- **pravé šikmé:** z horního rtu šikmo přes lícní krajinu mimo oční



Rozštěp horní střední

Odkazy

Související články

- Rozštěpy obličeje
- Typické rozštěpy obličeje
- Dutina ústní
- Dutina nosní

Externí odkazy

- O rozštěpech – vývojové fáze dítěte (<http://www.rozstepy.cz/o-rozstepech/vyvojove-faze-ditete>)

Použitá literatura

- MĚŠTÁK, Jan, et al. *Úvod do plastické chirurgie*. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.