

# Dermatitis papulosa eruptiva infantilis

Dermatitis papulosa eruptiva infantilis neboli syndrom Gianottiho-Crostiho je onemocnění vyvolané coxsackie viry.

## Epidemiologie

Objevuje se u dětí mezi 1. až 6. rokem, převážně u chlapců. Může se vyskytovat také v souvislosti s hepatitidou B nebo virem Epsteina a Barrové.

## Klinický obraz

- Prodromální příznaky, horečka, únava, onemocnění horních dýchacích cest.
- Na tvářích, hýždích a na extenzorových plochách končetin se objevuje papulovezikulózní exantém, který nesvědí.
- Eflorescence má hemoragický nádech, vynechává trup a může splývat ve velká ložiska.
- Přidružená může být lymfadenopatie a hepatosplenomegalie.

## Léčba

Léčba je pouze symptomatická.

## Průběh a prognóza

Exantém mizí asi po 2-3 týdnech, výjimečně po 8 týdnech.



syndrom Gianottiho-Crostiho

## Odkazy

### Související články

- Hand-foot-and-mouth disease

### Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. s. 129. ISBN 978-80-7262-371-6.