

Diferenciální diagnostika poruch polykání


Poruchy polykání (dysfagie) jsou vedoucím příznakem nemocí a úrazů jazyka, hltanu (orofaryngeální dysfagie) a jícnu (ezofageální dysfagie). Jedná se o poruchu pasáže potravy během polykání. Dysfagie je spojena s přechodným pocitem tlaku a váznutí sousta.

Typy poruch polykání:

- odynofagie;
- mechanická dysfagie;
- neuromuskulární dysfagie;

Odynofagie

Odynofagie neboli *bolestivé polykání* je podmíněna záněty, nádory nebo cizími tělesy. Bolesti jsou stupňovány polykáním. Při postižení hltanu a hrtanu často vystřelují do ucha (společná inervace). U jícnu postižený popisuje tlakovou a svíravou bolest, často i pyrózu. Pokusy o polknutí mohou být spojeny s dávením a aspirací potravy. Postižení často slintají a huhňají.



Polykání

Mechanická dysfagie

Je vyjádřena váznutím sousta. Příčiny mohou být neurogenní, myogenní a obstrukční. Provázena říháním, dávením, regurgitací, zvracením, foetor ex ore.

Neuromuskulární dysfagie

Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, bulbární léze, diabetická neuropatie, myozitidy, svalové dystrofie mohou vést k poruchám polykání. V jícnu jsou v popředí lokalizované poruchy peristaltiky, spazmy a atonie.

Odkazy

Související články

- Polykání
- Nervus vagus

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2009]. <http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl_jb.doc>.

Použitá literatura

- KLOZAR, Jan, et al. *Speciální otorinolaryngologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.