

Diskuse:Oxygenoterapie

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá

V článku bylo zkontrolováno • zdroje • citace • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • obrázky a licence • prolinkování • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel

Připomínky k článku

Doporučení 2018

Kdy by u akutně nemocných měla být zahájena léčba kyslíkem? Kde je dolní limit SpO₂? Kolik kyslíku by mělo u akutně nemocných být podáváno? Kde je horní limit SpO₂? <https://www.prolekare.cz/casopisy/anesteziologie-intenzivni-medicina/2018-6-10/lecba-kyslikem-u-akutne-nemocnych-doporuceni-do-klinik-praxe-107401> --

85-88% 90% 92% 95% 97%

DRobert (diskuse) 19. 1. 2023, 09:33 (CET) **Answer**

New comment

Send

Cancel

Minimální a maximální průtoky

Obličejová maska s průtokem pod 4l/min vede k retenci CO₂. Kyslíkové brýle s průtokem nad 4 l/min vedou k vysušení sliznic a následnému dýchání ústy --DRobert (diskuse) 10. 3. 2019, 23:51 (CET) **Answer**

New comment

Send Cancel