

Granuloma inguinale

Granuloma inguinale (známá též jako **donovanóza**) je pohlavně přenosné onemocnění vředového charakteru. Způsobené bakterií *Klebsiella granulomatis* (dříve zvaná *Donovania*, pak *Calymmatobacterium granulomatis*). Vyskytuje se hlavně v tropech a subtropích.

Klinický obraz

Projevuje se jako plazivý vřed s hypertrofickou spodinou. Při progresi onemocnění se šíří do okolí, jizví a způsobuje mutilace postižených oblastí.

Léčba

Doxycyklin, erytromycin po 2 týdny. Léčba vede ke zhojení.

Odkazy

Související články

- Syfilis
- Vrozená syfilis
- Rychlá reaginová reakce
- TPHA
- Chancroid
- Lymphogranuloma venereum
- HIV
- AIDS

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.

Donovanóza	
Granuloma inguinale	
	
Původce	bakterie <i>Klebsiella granulomatis</i>
Přenos	pohlavním stykem
Inkubační doba	1-12 týdnů
Infekčnost	vysoká na západě Nové Guineji, střední Austrálii, karibské oblasti, Africe
Léčba	antibiotika
Klasifikace a odkazy	
MeSH ID	D006100 (https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D006100)