

Konfigurace eflorescencí

Eflorescence se vyskytují na kůži či sliznicích izolovaně a ojediněle, ve výsevu (diseminace, exantém, enantém) nebo jsou uspořádané v různých konfiguracích.

Konfigurace

- lineární: psoriáza, lichen ruber
- moniliformní (růžencovité t.j. jednotlivě v řadě jako růženec)
- anulární (prstencovité)
- circinární (do kroužku), semicircinární (do polokruhu)
- serpiginózní (hadovité): tinea inguinalis
- herpetiformní: dermatitis herpetiformis
- zosteriformní: herpes zoster
- geografické, mapovité: psoriáza
- irisové: tinea faciei

Kóžnerův izomorfní fenomén – papuly v lineární exkoriaci – psoriáza, lichen ruber, verrucae planea juveniles

Odkazy

Související články

- Lokalizace kožních změn
- Kožní eflorescence

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 4.2.2011]. <<http://jirben2.chytrak.cz/>>.

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.