


Laparoskopická hysterektomie

Terminologie

Laparoskopický způsob odstranění dělohy je alternativou abdominální hysterektomie, není náhradou za vaginální hysterektomii. Výhodou je zejména minimální poškození břišní stěny s následným poklesem pooperační bolesti, morbidity a s rychlejší rekonvalescencí.

Historie

Technický vývoj a růst zkušeností s operační laparoskopií vyvrcholil v roce 1988 provedením první laparoskopické hysterektomie (LH). Tento výkon provedl americký vaginální operatér H. Reich, který byl zneklidněn vysokým počtem abdominálních hysterektomií ve své praxi.



Laparoskopická hysterektomie

Klasifikace

- Totální laparoskopická hysterektomie (TLH).
- Supracervikální laparoskopická hysterektomie (SLH).
- Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH):
 - laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH superiorní typ);
 - laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH inferiorní typ) s laparoskopicky provedenou disekcí děložních cév a pochvy.

Sedm základních kroků k hysterektomii

- Oddělení ligamentum rotundum a protětí horní části plica lata;
- oddělení tubo-uterinní junkce a utero-ovariálního vazů při zachování adnex nebo přetětí infundibulo-pelvického ligamenta;
- přetětí děložních cév;
- protětí pliky měchýře a jeho pilířů;
- oddělení komplexu kardiálních a utero-sakrálních ligamentů;
- provedení přední a zadní kolpotomie a oddělení hrdla od pochvy;
- uzávěr pochvy suturou.

Odkazy

Související články

- Děloha

Použitá literatura

- NEZHAT, Camran. *Operative gynecologic laparoscopy : principles and techniques*. 1. vydání. New York : McGraw-Hill, 1995. ISBN 0071054227.