

Lokalizace eflorescencí

Takzvané **predilekční lokalizace** jsou místa typická pro určitou chorobu, jsou dány vlivy zevními i vnějšími. Například *zákožka svrabová* na jemné kůži apod.

Nejčastější lokalizace

- **intertriginózní** lokalizace – místa vlhké zapáčky a kožní duplikatury; intertrigo, kvasinková a houbová onemocnění
- **orgánová** lokalizace – onemocnění určitých kožních orgánů
- **seboroická** lokalizace – v místech s vyšším zastoupením mazových žláz (kštice, obličej, nad hrudní kostí, mezi lopatkami a oblast genitálu)
- **solární** lokalizace – části těla nejčastěji vystavené slunci (obličej, krk, ruce...)
- **embolizační** lokalizace – dána hematogenním rozsevem, hlavně u lékových a infekčních exantémů (hrudník, boky, břicho, flexorové plochy ruky, vnitřní plochy stehen)

Odkazy

Související články

- Kožní eflorescence
- Konfigurace eflorescencí

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 4.2.2011]. <<http://jirben2.chytrak.cz/>>.

Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.