


Masseterový reflex

Masseterový reflex (*Jaw jerk reflex, Masseter reflex*) se vybavuje poklepem kladívka na prst vyšetřujícího, který je položen napříč přes bradu vyšetřovaného, přičemž pacient má pootevřená ústa. Vybavení tohoto reflexu patří k vyšetření funkce **n. trigeminus**. U zdravého pacienta je odpověď rychlý a přiměřený náskok přivření dolní čelisti, který je dán stahem žvýkacího svalstva.^[1]

Zvýšení masseterového reflexu může být u pacientů s pseudobulbárním syndromem, u bulbárního syndromu je reflex vymizelý. Dále je zvýšení reflexu běžné u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou.^[2] ► Masseterový reflex (video, neurologie 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video7.html>)



Odkazy

Související články

- Vyšetření šlacho-svalových reflexů a kožní citlivosti

Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 368 s. s. 80. ISBN 80-7262-160-2.