

# Primární ciliární dyskineze

- Starší název: syndrom nepohyblivých řasinek; OMIM: 244400 (<http://omim.org/entry/244400>)
- Patogeneze – AR dědičné onemocnění, generalizovaná porucha pohyblivosti řasinek a bičíků všech buněk;
  - pohyb chybí úplně nebo je pohyb nekoordinovaný;
  - původně byla popsána u Kartagenerovy trias (bronchiektázie, sinusitida, situs viscerum inversus).

## Klinický obraz

- Porucha samočistící schopnosti epitelu, dochází k produktivní expektoraci a k tvorbě bronchiektází.
- Další symptomy – sinusitida, chronická rýma, rinorea, nosní polypy, opakované otitidy, převodní porucha sluchu, perforace bubínku, obstrukce DC, opakované pneumonie, infertilita.
- Situs viscerum inversus je asi jen u 50 %.
- Diagnóza – potvrzení komplikované, nutno znát výsledek elektronové mikroskopie a vysokorychlostní videomikroskopie (HSVM).

## Terapie

- Symptomatická, podobná jako u jiných bronchiektází.

## Odkazy

### Související články

- Chronická onemocnění plic

### Reference

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Prim%C3%A1rn%C3%AD\\_cili%C3%A1rn%C3%AD\\_dyskineze&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Prim%C3%A1rn%C3%AD_cili%C3%A1rn%C3%AD_dyskineze&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.