

Reflex flexorů prstů



Reflex flexorů prstů se řadí mezi fyziologické myotatické (proprioceptivní) reflexy na horní končetině se segmentovou inervací C8.^[1] Reflex se vybavuje poklepem kladívka na šlachy flexorů prstů, zhruba na střed ventrální strany karpálního tunelu. Prsty ruky jsou v mírné flexi. Fyziologickou odpovědí je mírný náskok prstů do flexe. Při obtížích s vyvoláním reflexu vyzveme pacienta, aby mírně tlačil prsty proti prstům vyšetřujícího.^[2]

► Reflex flexorů prstů (video, Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video21.html>)

Odkazy

Související články

- Vyšetření šlacho-svalových reflexů a kožní citlivosti

Reference

1. AMBLER, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK, et al. *Klinická neurologie*. 2. vydání. Praha : Triton, 2008-. ISBN 9788073871574.
2. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.