

# Scapula

**Lopatka** (*scapula*) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny, především abdukce nad 90°.

Její tři okraje se označují:

## **margo medialis**

mediální okraj, rovnoběžný s podélnou osou páteře;

## **margo lateralis**

šikmý, kraniálním směrem se odchyluje laterálně;

## **margo superior**

horní rovnoběžný okraj.

Tyto tři okraje se stýkají ve třech úhlech:

## **angulus superior**

styk *margo superior* a *medialis*;

## **angulus inferior**

styk *margo medialis* a *lateralis*;

## **angulus lateralis**

styk *margo lateralis* a *superior*.

## Dorzální strana

Na dorzální straně (*facies posterior*) vybíhá hřeben (*spina scapulae*), který se na laterálním okraji lopatky odděluje a vybíhá v *acromion* (nadpažek). Hřeben rozděluje lopatku v první čtvrtině *margo medialis* a směřuje k *angulus lateralis*. Nad a pod hřebenem vznikají dvě jámy (*fossa supraspinata et infraspinata*), ve kterých jsou uloženy svaly ramenního pletence (z nich jsou klinicky nejvýznamější svaly rotátorové manžety). Z horního okraje vyčnívá zoubkovitý výběžek (*processus coracoideus*).

## Ventrální strana

Ventrální plocha lopatky (*facies costalis*) je mírně vyhloubena ve *fossa subscapularis*, na jejímž povrchu nalezneme drsné čáry zvané *lineae musculares*. Tyto čáry slouží pro připojení svalu *musculus subscapularis*.

## Laterální strana

Na laterálním úhlu se nachází kloubní jamka ramenního kloubu, **cavitas glenoidalis**. Z laterálního pohledu má tvar mělké oválné mističky.

*Acromion* a *processus coracoideus* ji kraniálně „zastřešují“, čímž vytváří kostěnou část *fornix humeri*.

Nad a pod *cavitas glenoidalis* se nachází drobné hrbolek pro začátky svalů:

## **tuberculum supraglenoidale**

na horní části jamky, zde se upíná dlouhá hlava bicepsu;

## **tuberculum infraglenoidale**

pod dolním okrajem jamky, začíná zde dlouhá hlava tricepsu.


## Osifikace

Osifikace lopatky začíná asi v 8. týdnu těhotenství, postupně vznikají další osifikační centra v *processus coracoideus*, *acromionu* a *fossa glenoidalis*. Od 14. do 20. roku dochází ke srůstu jednotlivých osifikačních center.

## Odkazy

## Související články

- Kosti horní končetiny
  - Metacarpus
  - Carpus



Lopatka z přední strany

**TA** A02.4.01.001 (<https://ifaai.unifr.ch/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20T98%20EN/02.4.01.001%20Entity%20T98%20EN.htm>)

**Artikulující kosti** humerus, clavica

**Typ artikulace** kulový volný kloub v articulatio humeri, plochý kloub v articulatio acromioclaviculare

**Osifikace** chondrogenní




Lopatka z přední strany, s popisky

- Radius
- Ulna
- Humerus
- Clavicula
- Svaly horní končetiny

## Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie*. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 516 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.



Lopatka ze zadu, s popisky