

Trombangiitis obliterans

Trombangiitis obliterans (*Bürgerova choroba*) je dnes velmi vzácná (Slovensko, Polsko, V Evropa, S Afrika, Asie). Postihuje především mladé muže, kuřáky a vede k amputacím dolních i horních končetin.

Etiologie a patogeneze

Etiologie je neznámá. Uplatňují se genetické vlivy (více u žluté rasy), kouření tabáku, infekce, nízká úroveň hygieny. Vzniká zánětlivý proces s granulomy v tepnách (malých a středních) a žilách horních i dolních končetin. V cévách končetin nacházíme rozsáhlé trombózy, které vedou k těžké ischemii končetiny.

Klinický obraz

- na končetinách migrující flebitidy – několikacentimetrové zánětlivé infiltráty v průběhu žil, po několika dnech ustupují a objevují se v jiném místě;
- spazmy digitálních tepen → blednutí prstů;
- mohou být plantární klaudikace;
- progredující nekrózy a gangrény prstů

Diagnostika

- *arteriografie*: normální nález na proximálních tepnách, rozsáhlé „mrkvovité“ obliterace malých distálních tepen + dlouhé, tenké „vývrtkovité“ kolaterály;
- *laboratoř*: známky zánětu v době zhoršení, není hyperlipidémie;
- neléčené onemocnění probíhá v nárazech – exacerbace jsou spojeny s novým výskytem migrujících flebitid, ischemie progreduje + jsou nutné opakované amputace

Terapie

- absolutní zanechání kouření, léčba infekcí, protizánětlivé léky při flebitidách;
- léčba ischemie obdobná jako u jiných onemocnění (možnosti revaskularizace omezené);
- sympatektomie.

Odkazy

Související články

- Trombóza
- Zánět

Použitá literatura

- KLENER, P, et al. *Vnitřní lékařství*. 3. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-430-X.

Trombangiitis obliterans

Thromboangiitis obliterans



CT angiogram - stenóza artérií

Rizikové faktory kouření

Klasifikace a odkazy

MKN	I73.1 (https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/I73.1)
OMIM	211480 (https://omim.org/entry/211480)
MedlinePlus	000172 (https://medlineplus.gov/ency/article/000172.htm)
Medscape	460027 (https://emedicine.medscape.com/article/460027-overview)