

# Bazaliom

Jde o **nejčastější maligní kožní nádor**. Jeho výskyt se v posledních 15 letech zdvojnásobil.

## Výskyt

Zvýšený výskyt pozorujeme po **40. roce věku**, nejrizikovější je skupina **nad 60 let**. Může být však v každém věku. Postihuje téměř výlučně jedince bílé rasy, pokud se objeví u pigmentovaných ras, je spojen s neobvyklými etiologickými faktory. Nádor vychází z keratinocytů epidermis.

## Klinický obraz, vývoj

Typické buňky jsou oválného tvaru a připomínají buňky bazální vrstvy epidermis – odtud název. Nádor **téměř nikdy nemetastazuje** – dosud bylo celosvětově popsáno přes 200 případů metastáz, převážně do lymfatických uzlin. Obvykle začíná jako uzlík, vrídek či stroupek, který se zpočátku významněji nemění. Roste pomalu, jakoby se plazí po povrchu. Tvoří ho jeden solitární uzel s vyvýšenými okraji, části mohou podléhat zvředovatění, které se nehojí. Někdy dochází ke **klamnému zlepšení**, vrídek se téměř vyhojí, aby se zanedlouho opět objevil a pozvolna se zvětšoval. Nenápadný průběh má často za následek, že se útvar posléze zvětší do rozměrů, které mohou být v některých lokalizacích léčebným problémem. Bazaliom na sliznicích naopak metastazuje velice často.



Bazaliom víčka



Pokročilý bazaliom horního víčka

## Příčina onemocnění

Stejně jako u dalších zhoubných onemocnění je příčina onemocnění **nejasná**. Hlavním etiologickým faktorem je chronické, dlouhodobé **vystavování kůže UV záření**.

## Prognóza

S výjimkou rozsáhlých či invazivně rostoucích nádorů bazaliom pacienta **neohrožuje na životě**. Pokud však nádor roste dostatečně dlouho, může vytvářet rozsáhlá ložiska s destrukcí sousedních tkání.

## Léčba

Chirurgické odstranění. Pokud není vyřazen celý, recidivuje! Je pak potřeba provádět excise, dokud není odstraněno celé ložisko. Vzhledem k místu výskytu (tvář) nelze opomenout estetickou stránku zákroku.



## Odkazy

### Související články

- Basaliom (preparát)
- Bazaliom/PGS
- Maligní kožní nádory: Melanom | Spinocelulární karcinom | Verukózní karcinom
- Prekancerózy v dermatologii
- Maligní mezenchymální nádory: Kaposiho sarkom | Dermatofibrosarcoma protuberans

### Zdroj

- Převzaté a zpracované na souhlas autora MUDr. VLADIMÍRA JANEČKA.

