

# Bolesti hlavy při sexuální a fyzické aktivitě

Bolest se objevuje v souvislosti s fyzickou aktivitou (např. cvičením) nebo při orgasmu nebo těsně před jeho začátkem, častěji u mužů. Je velmi silná, lokalizovaná occipitálně či frontálně, trvá několik minut až hodin. Částečně lze této bolesti předcházet zvýšením tělesné kondice, redukcí hmotnosti.

V léčbě se užívají běžná analgetika.

Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit zejména (zejména při prvním výskytu) subarachnoideální krvácení – provedeme CT mozku, event. vyšetření likvoru.



zvýšením kondice lze bolestem předcházet



## Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Bolesti\\_hlavy\\_p%C5%99i\\_sexu%C3%A1ln%C3%AD\\_a\\_fyzick%C3%A9\\_aktivit%C4%9B&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Bolesti_hlavy_p%C5%99i_sexu%C3%A1ln%C3%AD_a_fyzick%C3%A9_aktivit%C4%9B&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.