

# Christensenův fenomén

Při **propulzním pohybu mandibuly** (pohyb při ukusování sousta) dochází k posunu dolní čelisti ventrálně a kaudálně. Ve chvíli, kdy dosáhneme postavení zubů do pozice „hrana na hranu“, hrbolky horních a dolních zubů v laterálních úsecích chrupu od sebe oddálí a objeví se **klínovitá mezera** (nejširší distálně, meziálně se zužuje).

- Při lateropulzi se tento jev objeví pouze na jedné straně.
- V oblasti druhých molárů odpovídá výška mezery polovině sestupu kloubních hlavic temporomandibulárního koubu, ovšem jen tehdy, není-li překus řezáků a neuvažujeme-li Speeovu linii.
- Při artikulování celkových zubních náhrad je nutné docílit, aby při skusu hrana na hranu zůstal v kontaktu alespoň jeden pár antagonistů na každé straně. Kdyby byly v kontaktu pouze řezáky, jako je tomu u ozubené čelisti, náhrada by se páčila. V umělém chrupu je Christensenův fenomén vyrovnán pomocí oploštění Speeovy křivky a nahrazením předozadním zakřivením okluzní roviny.

## Odkazy

### Použitá literatura

- TRNEČKA, Lukáš a Břetislav MATYÁŠ. *Odborná terminologie* [online]. [cit. 2011-07-15]. <[https://www.szsvzs.cz/zt/odborna\\_terminologie.htm](https://www.szsvzs.cz/zt/odborna_terminologie.htm)>.