

Heberdenovy uzly

Heberdenovy uzly jsou **deformace distálních interfalangeálních kloubů ruky (DIP)**. Spolu s uzly Bouchardovými jsou klinickou a grafickou známkou osteoartrózy.

Etiologie

Některé práce^[1] naznačují, že se nejedná čistě o změny osteoproduktivní, ale že se jich účastní s kostí i ligamenta.

RTG nález

V korelace s klinikou nacházíme uzly nejčastěji na dorzolaterálním okraji distálních interfalangeálních kloubů ruky^[2]. Jedná se o známku pokročilé osteoartrózy.

Odkazy

Související články

- Bouchardovy uzly

Reference

1. MCGONAGLE, D, AL TAN a AJ GRAINGER, et al. Heberden's nodes and what Heberden could not see: the pivotal role of ligaments in the pathogenesis of early nodal osteoarthritis and beyond.. *Rheumatology* [online]. 2008, vol. 9, no. 47, s. 1278–1285, dostupné také z <[https://radiopaedia.org/articles/heberden-node](https://watermark.silverchair.com/ken093.pdf?token=AQECAHi208BE49Oooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfkAc485ysgAAcswggHHBgkqkhG9w0BBwagggG4MIIbtAIBADCCAa0GCSqGSib3DQEHAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMqgezy1DgaXgS-4ztrgUcg7AbihAZQWaleXqRSzzdZ5cPHLEmn0uOrBbyBw7mCuhe0EgGMOQtta8dVQLZGtmuoPiXbyWTOaEKneoMTsyC1s98hOz8BNDwDBVge1c7IOlWsALFsvK0mQjgraYgYC_gLiSGnr03Xjlx87yy25EAxuBz131ry6yeZ4vC2L3NDj_Jw18Tq4SHIwTBrsMQQv5nSQi893yKIUMufDmC0j2c_4t2q5or05RwwdPf1y_VWqQNSLk28eDR0oSdczgO_jo5xRsc8tdtoz3XB7gYg7b9qT-7jxFDzkv_LZqQnhzISDwwvIBcRMykelaUux26i5XNxwvtH_MwGAOT8VIYcjQo9jpr7ao5uHZPX2-EZU2R351p_dW2sCM-vPgfiFh6vXG0pYWqAj27jarb5MoFBs2gy9vDR0MLrRdyCaCvCc18>.2. LUIJKX, Tim. <i>Heberden Nodes</i> [online]. [cit. 2017-01-20]. <.



Heberdenovy uzly na prostém snímku rukou