

Lagoftalmus

Lagoftalmus je porucha postavení víček, při které je **oční štěrbina trvale otevřena**. Častěji dochází k postižení dolního víčka. Část spojivky a rohovky zůstává nekrytá, jejich **povrch osychá** (je přítomná i porucha roztírání slzného filmu) a vznikají zánětlivé změny – *keratitis e lagophthamo*.

Příčiny

Nejčastější příčinou je obrna lícního nervu. Mezi další příčiny patří:

- exoftalmus,
- retrakce víček,
- zvětšení bulbu,
- celkové příčiny (bezvědomí, kóma, celková anestezie).

Terapie

- **krátkodobá:** kapky, masti či kontaktní čočka,
- **dlouhodobá:** tzv. vlhká komůrka (konvexní plexisklo, které pevně přilepíme kolem oka – jako potápěčské brýle) nebo tarzorafie (sešití víček).

Odkazy

Související články

- Poruchy postavení víček
- Syndrom suchého oka
- Paréza lícního nervu
- Endokrinní orbitopatie

Použitá literatura


- BENEŠ, Jiří. *Otázky z očního lékařství* [online]. [cit. 2010-11-22]. <<http://jirben2.chytrak.cz/>>.

Doporučená literatura

- ROZSÍVAL, Pavel, et al. *Oční lékařství*. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 80-7262-404-0.
- KOLÍN, Jan. *Oční lékařství*. 2. vydání. Karolinum, 2007. 109 s. ISBN 978-80-246-1325-3.

Lagoftalmus

Lagophthalmus



Noční lagoftalmus

Rizikové faktory Ichthyóza

Klasifikace a odkazy

MKN G35 (<https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/G35>)