

# Meralgia paraesthesia

*Meralgia paraesthesia* je úžinový syndrom, při kterém dochází ke komprezi **n. cutaneus femoris lateralis** (z *plexus lumbalis*) při jeho průběhu z pánve pod *ligamentum inguinale*. Vyskytuje se častěji u obézních lidí, těhotných žen a diabetiků.

## Projevy


Projevuje se **intenzivními pálivými bolestmi** a parestéziemi na zevní straně stehna. V této oblasti může být i porucha čítí.

Bolesti se typicky zmírňují při flexi v kyčli.

## Léčba

Základním opatřením je snížit tělesnou hmotnost. Dále se provádí se obstříky lokálními anestetiky a kortikosteroidy. Mohou se podávat léky na léčbu neuropatických bolestí (karbamazepin, amitriptylin).

Při trvání problémů je indikována **chirurgická léčba** – uvolnění nervu. Její výsledky jsou často neuspokojivé<sup>[zdroj?]</sup>.



Červené  
oblast  
zásobení  
*n. cutaneus  
femoris  
lateralis*

## Odkazy

### Související články

- Obezita
- Diabetes mellitus
- Úžinové syndromy

### Externí odkazy

- Meralgia paraesthesia - Mayo Clinic (<https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/meralgia-paresthetica/symptoms-causes/syc-20355635>)

### Převzato z

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2010]. <<http://www.jirben.wz.cz/>>.

### Použitá literatura

- AMBLER, Zdeněk. *Základy neurologie*. - vydání. Galén, 2006. 351 s. ISBN 9788072624331.