

Mezičelistní vztahy

Stanovení a registrace mezičelistních vztahů u celkové náhrady


- U celkové snímatelné náhrady je čelist bezzubá – pacient ztratil všechny opěrné zóny chrupu, proto mezičelistní vztahy rekonstruuujeme, ne jen registrujeme.
- Vychází z klidové polohy mandibuly;
- je nezbytná vzpřímená poloha pacienta;
- využíváme voskové šablony, které upravujeme vertikálně i horizontálně.

1. Vertikální čelistní vztahy

- měli bychom navodit vzdálenost, která je shodná s původní výškou skusu;
- vycházíme ze vzdálenosti nasion – pogonion zmenšené o 2–3mm (klidovou skusovou mezeru);
- nejdříve upravíme horní šablonu dle průběhu okluzní roviny (ve front. oblasti rovnoběžná s bipupilární linií a v postranních úsecích je rovnoběžná s protetickou rovinou);
- postupným seřezáváním šablon se dosahuje optimálního postavení čelistí (rozdíl mezi klidovou a centrální polohou mandibuly je cca 2–3mm);
- šablony spojíme nahřátými sponkami;
- vyznačíme linii úsměvu, středovou linii a postavení špičáku (linie půlící úhel mezi kolmicí spuštěné z nosního křídla a nasolabiální rýhou).

2. Horizontální čelistní vztahy

- doporučuje se unavit žvýkací svalstvo opakovaným otevíráním a zavíráním úst a tím uvolnění žvýkacího svalstva;
- přesnější jsou metody grafické (šípového hrotu).



mezičelistní vztahy

Odkazy

související články

- Zubní náhrada | Fixní náhrady

Zdroj

- DOSTÁLOVÁ, Tatjana. *Fixní a snímatelná protetika*. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.