

# Náhlá nedoslýchavost

Náhlá nedoslýchavost je onemocnění, kdy dojde k náhlému zhoršení či ztrátě sluchu, aniž bychom věděli příčinu.

## Známky náhlé nedoslýchavosti

- náhlé zhoršení až ztráta sluchu bez zjevné příčiny,
- často je **provázáno ušním šelestem** a případně závratí rotačního charakteru.

## Etiologie

- **neznámá**,
  - patrně jde o ischemii vnitřního ucha v povodí *a. labyrinthi* (spazmus, embolie, trombóza),
  - méně často se uvažuje o virové infekci.

## Výskyt

- postihuje všechny věkové skupiny, **u dětí je vzácné**.

## Vyšetření

- **na audiogramu** – percepční sluchová vada různého stupně,
- dle jiných vyšetření (BERA, otoakustické emise) jde o kochleární poruchu,
- **postižení je většinou jednostranné**.

## Terapie

- empirická – podávání vazodilatačních látek, nootropika, vit. B, kortikoidy...

## Prognóza

- nejistá, pokud se sluch nezlepší do 10 dnů po začátku terapie, už se nezlepší.

## Odkazy

## Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2009]. <[http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl\\_jb.doc](http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl_jb.doc)>.

## Použitá literatura

- KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngoskopie. 1. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X, ISBN 80-246-1125-2



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=N%C3%A1hl%C3%A1\\_nedosl%C3%BDchavost&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=N%C3%A1hl%C3%A1_nedosl%C3%BDchavost&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.