

Poruchy pohlavní identity

Jedná se o sexuální deviaci. Etiologie je nejasná, nejspíše je výsledkem složitého ontogenetického vývoje. Svou úlohu zde v jistém smyslu mají prenatální androgeny.

Transsexualismus

Jedná se o nespokojenost se svým vlastním anatomickým pohlavím. Je snaha získat opačné pohlaví. Pro stanovení diagnózy je nutné dotyčného sledovat minimálně 2 roky. Nejedná se to o transvestitismus!!!

Transvestitismus dvojí role

Vyznačuje se převlékáním se do šatů opačného pohlaví bez sexuálního vzrušení.

Porucha pohlavní identity v dětství

Poprvé se objeví vždy před pubertou. Postižený si přeje být opačného pohlaví. Více se vyskytuje u chlapců, porucha má trvalý ráz. Asi třetina z nich jsou homosexuálové.

Odkazy

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2006. [cit. Otázky z Psychiatrie]. <<http://jirben2.chytrak.cz/>>.

Použitá literatura

- RABOCH, Jiří, et al. *Psychiatrie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Poruchy_pohlavn%C3%AD_identity&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.