

Posthemoragická anémie

Akutní krvácení

- dochází k **oligemii** (snížení objemu krve) - k oběhovému selhání vede náhlá ztráta cca 1/3 objemu krve (tj. cca 1,5-2 l u dospělého člověka),
- Klinicky se ztráta krve projeví tachykardií, snížením krevního tlaku, nitkovitým pulsem, chladnými končetinami a dušností (z důvodu nedostatečné transportní kapacity pro kyslík). Po doplnění intravaskulárního objemu se můžou objevit typické známky anémie (únava, dušnost, bledost, tachykardie).
- V krevním obrazu se krvácení projeví až po několika hodinách, až dojde k přesunu chybějícího intravaskulárního objemu tekutiny z intersticia. Anémie má pak obraz **normochromní normocytární**. Časem dojde ještě k **zvýšení** počtu **retikulocytů**.
- Terapie: zastavit krvácení, chybějící objem krve se doplní v závislosti na množství krevních ztrát náhražkami krevní plazmy (koloidní roztoky), plazmou nebo plnou krví.

Chronické krvácení

- Nejčastější příčiny: **GIT** (vředová choroba žaludku a duodena, nádory, hemoroidy), **urogenitál** (metroragie, z ledvin, moč. měchýře)
- Anémie je způsobena nedostatkem Fe v organismu (sideropenická anémie), kvůli jeho zvýšeným ztrátám. K tomu mohou již vézt **denní ztráty 2-4 ml** krve.
- V krevním obrazu je přítomna **hypochromní mikrocytární** anémie.

Anémie dle morfologie:

- normocytární, makrocytární, mikrocytární anémie
- normochromní, hypochromní, hyperchromní anémie

Anémie dle patogeneze:

- Anémie ze zvýšených ztrát erytrocytů: posthemoragické anémie, hemolytické anémie
- Anémie ze snížené tvorby erytrocytů

Anémie dle MKN-10:

- Nutriční anémie ([https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Nutriční anémie](https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Nutriční%20anémie)) - Anémie z nedostatku železa, Anémie z nedostatku vitaminu B12, Anémie z nedostatku kyseliny listové
- Hemolytické anémie ([https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Hemolytické anémie](https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Hemolytické%20anémie)) - Anémie způsobená poruchami enzymů, Talasemie, Srpkovitá anémie, Dědičná sférocytóza, Dědičná eliptocytóza, Získané hemolytické anémie (Hemolyticko-uremický syndrom, Paroxysmální noční hemoglobinurie)
- Aplastické a jiné anémie ([https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Aplastické a jiné anémie](https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/Aplastické%20a%20jiné%20anémie)) - Aplastická anémie, Získaná čistá aplazie červených krvinek (erytoblastopenie), Blackfanův-Diamondův syndrom, Fanconiho anémie, Akutní posthemoragická anémie, Sideroblastická anémie

Odkazy

Související články

- Anémie

Použitá literatura

- PAVEL, Klener, et al. *Vnitřní lékařství*. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-857-5.
- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 12.4.2010]. <<http://langenbeck.webs.com>>.

Akutní posthemoragická anémie

Acute posthemorrhagic anemia

Klinický

obraz známky **krvácení**:
tachykardie,
hypotenze, studené
končetiny;
známky **anémie**:

únava, bledost,
dušnost, tachykardie

Léčba

náhražky plazmy,
plazma, plná krev

Klasifikace a odkazy

MKN D62 (<https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/D62>)

