

Průjmy vyvolané léky

Průjem vyvolaný léky je velmi častým (nežádoucím) účinkem terapie. Praktický význam mají průjmy při terapii:

- antibiotiky,
- cytostatiky,
- digitalisem,
- laxativy.

Antibiotika

Terapie ATB vedou často k mírným průjmům z důvodu porušení střevní mikroflóry. Může však dojít i ke vzniku život ohrožující **pseudomembranózní kolitidy**.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Pseudomembranózní enterokolitida.*

Cytostatika

Cytostatika působí na proliferující buňky tkání, tedy i na střevní sliznici, která má schopnost se periodicky obnovovat. Nedostatečná schopnost obnovy slizniční bariéry vede k množení bakterií a potlačení některých imunitních dějů. Tím pádem pronikají bakterie mnohem snadněji do střevní stěny.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Cytostatika.*

Digitalis

Digitalis je lék používaný při léčbě srdečního selhání. Gastrointestinální nežádoucí účinky vznikají v důsledku jeho působení na dráhy parasympatiku.

 **Průjem může být jeden z projevů závažné digitalisové intoxikace.**

Laxativa

Laxativa jsou léky původně určené pro terapii zácpy.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Laxativa.*

Odkazy

Související články

- Antidiaroeika

Reference

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.

Použitá literatura

- HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. *Pediatric*. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. [ISBN 80-7262-178-5](#).
- ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. *Pediatric*. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. [ISBN 978-80-89171-49-1](#).



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Pr%C5%AFjmy_vyvolan%C3%A9_l%C3%A9ky&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

