

Recidivující bronchitida

- Definice: **kašel přetrvávající déle než 3 týdny a vyskytující se 3x za posledních 12 měsíců**,
- je to třeba považovat za projev jiného základního onemocnění (je to vlastně dif. dg. protrahovaného kaše),
- u některých dětí s recidivujícími bronchitidami se vyvíjí později astma nebo CHOPN,
- etiologie – ve většině případů jde o stavu po akutních respiračních infekcích,
 - musíme zejména pomýšlet – na astma, vrozené vývojové vady dýchací soustavy, na cizí tělesa v DC, bronchiektázie, defekty imunity, přítomnost ložisek fokální infekce (adenoidní vegetace, chronická tonsilitida, sinusitida), je nutné vyloučit tuberkulózu a cystickou fibrózu,
 - další příčiny – irritancia (chemikálie, aspirace při GER, kouř, znečištěné ovzduší), primární ciliární dyskinezia, plícní absces, srdeční vady,
 - psychogenní kašel – chybí mu zjistitelná somatická příčina (je to prakticky tik),
 - kašel je hlučný, mizí ve spánku,
- diagnóza – nutno pátrat po jednotlivých příčinách,
 - protože jedno z nejčastějších příčin je astma – rutinně provádíme bronchoprovokační testy (odhalíme bronchiální reaktivitu po inhalaci histaminu, acetylcholinu nebo po pětiminutovém běhu),
 - také je dobré provádět rinomanometrii – vyloučí poruchu průchodnosti nosu jako příčinu.

Odkazy

Související články

- Akutní laryngitida
- Obstruktivní bronchitida
- Akutní bronchitida
- Bronchiolitida
- Astma

Reference

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2009]. <<http://jirben.wz.cz>>.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Recidivuj%C3%ADc%C3%A1_bronchitida&action=history) a jej. O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.