

Vaskulogenní impotence

Impotence – neschopnost erekce (erektilní dysfunkce), může být psychogenní nebo organická.

Arteriogenní

Nedostatečný tepenný přítok


- Centrální – tepenný uzávěr v aortoiliakální oblasti.
- Periferní – tepenný uzávěr větví pánevních tepen nebo přímo tepen penisu.
- Ostatní – tepenná poranění při zlomeninách pánevních kostí, dysplasie hlubokých tepen penisu.

Léčba

- Rekonstrukční výkony na pánevních tepnách (endarterektomie, bypassy).
- Nebo penilních tepnách (epigastriko-penilní bypass).
- Při jejich selhání implantace penilní endoprotézy.

Flebogenní

- Zvýšený žilní odtok (nedostatečná blokáda).
- Léčba podvazem nebo embolizací žil (v. dorsalis penis, v. penis profunda).
- Konservativní léčba vasoaktivními látkami (relaxace hladké svaloviny přírodních tepen) – prostaglandiny, papaverin, sildenafil (Viagra®) = inhibitor fosfodiesterasy.



Penilní protéza

Odkazy

Související články

- Erektilní dysfunkce
- Rekonstrukce tepen

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 28.6.2010]. <<http://jirben.wz.cz>>.