

Záněty vlasových folikulů

Mezi záněty vlasových folikulů řadíme procesy nazývané **folliculitis**, **ostiofolliculitis** a **furunculus**.

Jedná se o onemocnění způsobené nejčastěji stafylokoky postihující vlasový nebo chlupový folikul.

Folikulitida

Folikulitida se obvykle projevuje jako jasně červené papulopustuly. Stafylokoky pronikají do celé hloubky vlasového folikulu a způsobují tzv. perifolikulární zánět. Mohou se vyskytovat kdekoli v ochlupené části kůže. Typický je jejich výsev u mladých chlapců, kteří se začínají holit. Na kůži obličeje a zad je dále možné pozorovat sekundární folikulitidu při současném výskytu *acne vulgaris*.

Ostiofolikulitida

Při této afekci dochází k zánětu ústí vlasového folikulu. Projevují se jako malé pustuly s napjatým povrchem (někdy může být patrné i malé vklesnutí), ze kterých vystupuje chlup. Obsahem pustuly je zelenožlutý hnis, v okolí je patrný úzký zánětlivý lem. Vyskytují se u dětí ve vlasaté části hlavy i u dospívajících navíc na končetinách a v místech vlhké zapádky.

Furunkl

Furunkl (nežít) vzniká při postupování infekce do stran a do hloubky a zároveň dochází k nekróze celého folikulu i perifolikulární tkáně. Nejprve se na kůži vytvoří tuhý bolestivý útvar, následně vzniká kolem nekrotického folikulu demarkační zánět a dochází k tvorbě abscesu. Při odstranění povrchové pustuly dojde k vyprázdnění abscesu navenek a ke zhojení jizvou.

Nejčastěji se vyskytuje na hýždích, vnitřní straně stehien, v zátylku a zevním zvukovodu. S rizikem trombózy kavernózních sinů je spojen výskyt furunklu na horním rtu, v nosním vchodu a nasolabiálních rýhách. Obvykle bývají postiženy děti školního věku a dospívající.



folikulitida

Odkazy

Související články

- Furunkl
- Karbunkl
- Pyodermie

Zdroj

- ČAPKOVÁ, Štěpánka. *Hnisavé kožní infekce (pyodermie)* [online]. E15, ©2009. [cit. 2014-05-31]. <<https://web.archive.org/web/20160331222721/http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/hnisave-kozni-infekce-pyodermie-431510>>.